

DOŻYLNIE PODANIE PREPARATU ŻELAZA (FERINJECT)

WSKAZANIA

- niedokrwistość z niedoboru żelaza
- nietolerancja lub niewystarczająca odpowiedź na leczenie doustnymi preparatami żelaza
- ciężkie objawy uboczne podczas leczenia doustnymi preparatami żelaza
- zaburzenia wchłaniania lub choroby zapalne przewodu pokarmowego

PRZECIWSKAZANIA

- niedokrwistość, która nie jest spowodowana niedoborem żelaza
- nadmierne nagromadzenie lub zaburzenia przyswajania żelaza
- rozpoznana poważna nadwrażliwość na inne podawane pozajelitowo preparaty żelaza
- nadwrażliwość na substancję czynną, na produkt leczniczy żelaza lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (wodorotlenek sodu, kwas solny)

POINFORMUJ LEKARZA, JEŚLI:

- jesteś w ciąży lub próbujesz zajść w ciążę,
- masz astmę, egzemę lub inne uczulenia,
- miałeś kiedykolwiek reakcję na jakiegokolwiek rodzaju zastrzyk lub wlew,
- chorujesz na hemochromatozę lub masz problemy z wątrobą,
- bierzesz jakiegokolwiek leki (włącznie z ziołowymi i lekami dostępnymi bez recepty),
- podejrzewasz u siebie aktywną infekcję lub zakażenie.

PRZEBIEG

Dożylne żelazo podaje się we wlewie dożylnym - wymaga to założenia wkłucia dożylnego (wenflonu). Czas trwania infuzji (ok. 30 minut) pacjent spędza wygodnie siedząc lub leżąc – w zależności od preferencji.

Dla bezpieczeństwa po przetoczeniu preparatu żelaza pacjent zostaje na co najmniej półgodzinnej obserwacji.

SKUTKI UBOCZNE

Najczęściej występujące skutki uboczne są przejściowe i mogą objawiać się: bólem głowy, mdłościami, bólem mięśni lub stawów, uczuciem gorąca, podwyższonym ciśnieniem krwi. Czasem mogą one wystąpić 1 do 2 dni później. Najczęściej ustępują one same po kilku dniach.

Bardzo rzadko może dojść do silnej reakcji uczuleniowej, która pojawia się zazwyczaj w ciągu kilku minut po podaniu leku. Należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę o wystąpieniu któregokolwiek z wymienionych objawów:

- wysypka (np. pokrzywka), swędzenie,
- obrzęk warg, języka, gardła lub całego ciała,
- duszność, świszczący oddech,
- ból w klatce piersiowej.

Brązowe zabarwienie skóry może nastąpić w wyniku wycieku żelaza do tkanki wokół miejsca nakłucia. Zdarza się to rzadko, ale plama może być długotrwała lub pozostać na stałe. Ponadto mogą wystąpić reakcje miejscowe, które powodują ból i zapalenie w miejscu iniekcji lub w jego pobliżu, a także mogą wywołać miejscowe zapalenie żyły. Powiadom natychmiast lekarza lub pielęgniarkę o jakimkolwiek bólu, pieczeniu, zaczerwienieniu lub opuchnięciu w miejscu nakłucia.



ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA DOŻYLNE PODANIE ŻELAZA

Imię i nazwisko:

PESEL:

Oświadczam, iż osobiście zapoznałem się z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Zostałem poinformowany przez lekarza o celu, charakterze, możliwych następstwach (w tym powikłaniach) proponowanego zabiegu i skutkach jego zaniechania. Lekarz udzielił mi wyjaśnień w sposób satysfakcjonujący i nie mam dodatkowych pytań.

Niniejszym wyrażam zgodę na dożylne podanie żelaza.

.....
Data

.....
Czytelny podpis pacjenta